

LA FONCTION DE RELATION : LA BLENNORAGIE

OBJECTIF

Participer à la lutte contre la blennorragie.

PRECIS DE COURS

Agent responsable :

Une maladie sexuellement transmissible, causée par la bactérie *Neisseria gonorrhoea* (ou gonocoque)

Symptômes :

Chez l'homme :
inflammation de l'urètre,
urine jaunâtre, brûlure à la miction, testicules enflés.

Chez la femme : pertes blanches, douleurs abdominales, miction douloureuse, saignement vaginal entre les règles, douleurs pelviennes



Transmission :

par les rapports sexuels, mauvaise hygiène des organes.

Traitement :

En cas d'absence de traitement adéquate, la blennorragie peut mener à la stérilité.

Activité 1



Salut, moi c'est **Army**.

J'ai un copain, il s'appelle **Sim**, il a 15 ans et on sort ensemble depuis 5 mois. Mais depuis quelques temps, ça ne va plus trop bien entre nous. C'est gênant à dire mais on a tendance à se disputer à propos de sexe. Il a beaucoup insisté pour qu'on ait des rapports sexuels. Il m'a vraiment harcelée au téléphone pour que je couche avec lui. Il a dit que si je l'aimais, je le ferais pour le rendre heureux, mais moi dans tout ça ? Je n'en avais pas vraiment encore envie. J'ai peur qu'il me plaque alors j'ai fini par céder. Quelques semaines plus tard, j'ai attrapé une maladie appelée « la blennorragie ».

- 1) Identifiez par quel moyen Army a contracté la blennorragie.
- 2) Proposez aux filles des conseils afin de gérer la situation autrement.

Activité 2

Situation : **Milo** ne veut pas être contaminé par la blennorragie. Il se renseigne sur les transmissions de la blennorragie.

Document 1 : la blennorragie

Transmission

La transmission de la gonococcie est très facile et peut se faire au cours de pénétrations vaginales, anales ou buccales.

Un contact sexuel sans pénétration peut suffire à une contamination.

Le nombre de diagnostics d'infection à gonocoque rapportés a augmenté de 53% entre 2016 et 2018. Cette augmentation s'observe chez les HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) (+58%) et chez les hétérosexuels (+29%).

Les personnes diagnostiquées pour une gonococcie sont majoritairement des HSH (71%).

(Source : [Bullein de santé publique IST](#) - novembre 2019)

En t'aidant du document 1, indiquez les facteurs de risque à la contamination par la bactérie *Neisseria gonorrhoea* (ou gonocoque)

Activité 3

I- Situation : L'exposition à la blennorragie est toujours possible en cas d'accident. Francis se demande quel serait la démarche à adopter.

A partir du document ci-dessous, déduisez les conduites à tenir en cas de doute ou de prise de risque lors d'une relation sexuelle.



II- Elaborez des messages positifs destinés aux adolescents pour lutter contre la blennorragie.